

Vacuna fiebre amarilla

- Previene: Fiebre amarilla. Enfermedad transmitida por la picadura de mosquito infectado.
- Esquema en zonas de riesgo:
2 dosis: 18 meses de edad y refuerzo a los 11 años de edad.
En Viajeros por requisito del Reglamento Sanitario Internacional 1 dosis.
- Indicación:
En Calendario Nacional de Inmunizaciones, para personas que viven en área de riesgo (provincias de Misiones, Corrientes, y algunos departamentos de Salta, Jujuy, Formosa y Chaco).
Viajeros que ingresan a áreas de riesgo o por requisito del Reglamento Sanitario Internacional.
- Efectos adversos post-vacunación: Es poco frecuente el dolor de cabeza, muscular, reacción local (dolor, eritema y tumefacción) y fiebre entre el 3er. y 7mo. día posterior a la aplicación. Las reacciones graves son de muy baja frecuencia. Se observa enfermedad neurotrópica en menores de 6 meses de edad, y enfermedad viscerotrópica en mayores de 60 años.
- Contraindicación: Personas con inmunodeficiencia grave y durante el embarazo.

*La información aquí brindada no invalida la opinión de su médico.
Ante cualquier duda comuníquese con él o con nuestro Staff Científico.
www.previvax.com.ar / cientifico@previvax.com.ar*

